



# Pollorina No.2 Plus

## Beneficios



Por su partícula en migaja, favorece el consumo mejorando la uniformidad en la parvada.



Por su balance de Calcio, Fósforo y Vitamina D3, favorece el desarrollo del hueso medular, asegurando buena calidad del cascarón en la futura ponedora.



Fortalece la salud de las pollitas.



Con el nivel de proteína y energía óptimo para esta etapa.

**CARACTERÍSTICAS:** Alimento balanceado medicado con Flavomicina para pollitas de postura de 13 semanas de edad a primer huevo. Es un alimento completo, balanceado para satisfacer todos los requerimientos nutritivos de las pollas en desarrollo. Indicado para prevenir infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Flavomicina, como *Salmonella typhimurium*. Su presentación en migaja asegura mayor consumo, logrando mejores pesos y mejores uniformidades en la parvada. Minimiza los riesgos de presencia de factores anti-nutricionales o tóxicos durante esta etapa.

## Ingredientes

Maíz o sorgo molido o trigo, harina de trigo, pastas y subproductos de oleaginosas, subproductos de cereales, harina de pescado, carbonato de calcio, levaduras deshidratadas (*Saccharomyces cerevisiae boulardii* 4x10<sup>9</sup> UFC/kg), ortofosfato de calcio, sal común (cloruro de sodio); vitaminas: A, D, E, K, B-1, B-2, B-6, B-12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, colina; minerales orgánicos (iodo, hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc), y/o color amarillo #5; enzimas deshidratadas (fitasa: 500 FTU/kg, xilanasas: 1200 U/kg, β-glucanasas: 200 U/kg, celulasas: 200 U/kg, manasa: 1800 U/kg), carotenoides naturales, antibiótico: Flavomicina 2 g/t.



REG. SADER A-05444-578



## Plan de Alimentación para Aves de Postura



	¿CUÁNDO DARLO? EDAD	¿CUÁNTO DARLO? POR DÍA	CONSUMO TOTAL POR ETAPA
POLLORINA NO.2 <sup>®</sup>	desde la semana 11 hasta la 16	11 SEM = 59 g al día 12 SEM = 63 g al día 13 SEM = 64 g al día 14 SEM = 67 g al día 15 SEM = 69 g al día 16 SEM = 70 g al día	2.744 Kg

## Presentación 20 Kg Migaja

### Análisis Garantizado

Proteína cruda	16.0%	Mín.
Grasa cruda	3.0%	Mín.
Fibra cruda	7.0%	Máx.
Humedad	12.0%	Máx.
Cenizas	10.0%	Máx.
E.L.N.	52.0%	

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** A libre acceso vía oral, de 13 semanas de edad a primer huevo. Su venta requiere receta médica.

**ADVERTENCIAS:** No almacenar el alimento en lugares húmedos, calientes y mal ventilados, hágalo en sitios secos y protegidos de roedores, insectos y otros animales. Estibar sobre tarimas y nunca dejar el alimento directamente sobre el suelo y/o en contacto con paredes. De salida al alimento que tenga más tiempo en sus bodegas para evitar su envejecimiento.

**No se administre a aves en producción de huevo que se destine al consumo humano.**

**CONSULTE A SU MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA.  
VÍA DE ADMINISTRACIÓN ORAL.**